

Su procedimiento estará a cargo del Doctor: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha del procedimiento: \_\_\_\_\_ Hora de llegada: \_\_\_\_\_ AM/PM

Comentarios: \_\_\_\_\_

## HalfLyte<sup>®</sup> & comprimido de bisacodilo Kit de preparación intestinal

PEG-3350, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio y cloruro de potasio para solución oral y comprimido de liberación lenta de bisacodilo



### El día antes del procedimiento:

**NO ingiera alimentos ni beba leche. Beba líquidos translúcidos solamente. Puede tomar cualquiera de los líquidos indicados a continuación, siempre que no sean de color ROJO ni VIOLETA:**

- Jugos de fruta colados sin pulpa (manzana, uva blanca, limonada)
- Agua
- Caldo translúcido
- Café o té (sin leche ni crema artificial)
- Gatorade<sup>®</sup>
- Refrescos con o sin gas
- Gelatina sola Jell-O<sup>®</sup> (sin agregado de frutas ni otros ingredientes)
- Paletas heladas Popsicle<sup>®</sup> (solamente azules, verdes, amarillas, anaranjadas o rosadas)
- Kool-Aid<sup>®</sup> (u otras bebidas con sabor frutal)

#### Nota:

- HalfLyte<sup>®</sup> & comprimido de bisacodilo Kit de preparación es indicado para limpiar el colon como preparación para una colonoscopia en adultos.
- Si tiene colitis ulcerosa grave y activa o toma medicación, como un diurético, consulte al médico antes de usar este producto.
- Puede ocurrir hinchazón o distensión abdominal antes del primer movimiento intestinal. Si la distensión o el malestar abdominal continúan, deje de tomar la solución HalfLyte temporalmente o tome las porciones a intervalos más prolongados hasta que desaparezcan los síntomas.
- No tome ningún otro medicamento dentro del plazo de 1 hora de haber comenzado a beber la solución.
- No tome grandes cantidades de líquidos translúcidos después de tomar la solución HalfLyte hasta finalizada la colonoscopia.
- Si tiene preguntas sobre este producto, consulte a su médico.

\* Esta solución reconstituida se puede refrigerar.

### Éste es un ejemplo de un día habitual antes del procedimiento:

	SI COMIENZA A LAS 3:00 P.M.
TOME EL COMPRIMIDO	3:00 PM
MEZCLE LA SOLUCIÓN	4:00 PM
ESPERE A QUE SE PRODUZCA MOVIMIENTO INTESTINAL	3:00 PM – 9:00 PM
DESPUÉS DE PRODUCIRSE EL MOVIMIENTO INTESTINAL	BEBA TODA LA SOLUCIÓN

### Debe completar todos los pasos que se indican a continuación:



\_\_\_\_\_ AM/PM

#### TOME EL COMPRIMIDO

- Tome el comprimido de bisacodilo con agua.
- NO lo mastique ni triture.
- No tome el comprimido de bisacodilo dentro de la primera hora después de haber tomado un antiácido.



\_\_\_\_\_ AM/PM

#### MEZCLE LA SOLUCIÓN

- Abra un sobre del sabor de su elección y vierta el contenido en el frasco de HalfLyte. Deseche los sobres que no haya usado. La solución se puede usar con o sin saborizante.
- Agregue agua potable hasta la línea marcada en la parte superior del frasco.
- Tape el frasco y agite hasta que el polvo se disuelva.\*
- La solución reconstituida será translúcida e incolora. Úsela dentro de las 48 horas. No se debe añadir ningún ingrediente adicional a la solución (a excepción de uno de los sobres de saborizante incluidos).



\_\_\_\_\_ AM/PM

#### ESPERE A QUE SE PRODUZCA MOVIMIENTO INTESTINAL (O UN MÁXIMO DE 6 HORAS)

- Después del movimiento intestinal (generalmente al cabo de 1 a 6 horas), comience a beber la solución.
- Si al cabo de 6 horas aún no se ha producido ningún movimiento intestinal, comience igualmente a beber la solución.



#### BEBA TODA LA SOLUCIÓN

- Tome 1 vaso (8 onzas) cada 10 minutos (aproximadamente 8 vasos). Es mejor tomar todo el vaso rápidamente de una vez en lugar de tomarlo en varios sorbos.
- Es importante que tome TODA la solución. Esto le llevará aproximadamente 1 hora y media.

Para obtener más información sobre este producto, llame al 1-800-874-6756 o visite nuestro sitio web en [www.halflyte.com](http://www.halflyte.com).

Proporcionado como un servicio informativo de **BrainTree** LABORATORIES, INC